

HE400AZ medium

Chemically defined medium

1 製品情報

HE400AZ 培地は、ヒト由来 HEK293 細胞（例；Expi293F 細胞、293-F 細胞、293T 細胞等）の浮遊培養（発現&生産）のためにデザインされた、化学的に成分が明らかな完全合成培地です。

HE400AZ 培地には、タンパク質や抗生物質、加水分解物、動物成分、植物成分、高分子、フェノールレドを含まず、ロット間の均一性を高めた培地です（エンドトキシンは 0.25 EU/mL 未満）。このため、ヒトモノクローナル抗体等の組換えタンパク質の精製ステップをより容易に進めることができます。また、遺伝子導入や遺伝子発現を阻害しませんので、293 細胞への高効率トランスフェクション試験や組換えタンパク質、ワクチン用ウイルス等の生産システムに利用できます。

（保存温度；2–8°C 冷暗所）

2 培養条件

Cell line: 293 cells

Culture type: Suspension

Culture vessels: Flask, plate, dish, or culture bag, etc.

Incubate atmosphere: Humidified atmosphere of 5–8% CO₂ in air

Temperature range: 36°C to 38°C

Shaker culture: 120–130 rpm

3 ご使用の前に

- ・開封後は期限表示に関わらずお早めにご使用ください。
- ・HE400AZ 培地は、L-アラニル-L-グルタミンを加えた Ready-to-use の培地です。
- ・HE400AZ 培地には、抗生物質は含まれていません。血清培養と異なり、無血清培養時に抗生物質を添加する際には注意が必要です。抗生物質が細胞増殖を抑制する場合があります。ご使用の際には、血清培地で使用する場合と比べて、半分量～10 倍量少ない条件でのご使用をオススメしています。

4 培養プロトコール

(1) 凍結細胞の播種

293 細胞 (凍結保存 ; 無血清培地に馴化した細胞) を、素早く Water-Bath 中で溶解します。HE400AZ 培地を 10 mL 加えた 15-mL 用の遠心チューブに、293 細胞を移します。遠心回収 (200 x g、5 分間) した細胞ペレットに、HE400AZ 培地を 10 mL 加えて懸濁します。細胞数と生存率を測定します。

培養形態 (シェーカー培養 / 静置培養) によって、下記の培養手法を選択ください。凍結保存した 293 細胞は、継代培養を 3 回繰り返して、細胞の状態を回復させてから、研究試験にご使用ください。

(2) 継代培養

< シェーカー培養 (125-mL Shaker Flasks) >

細胞密度 3×10^5 cells/mL ($2 - 4 \times 10^5$ cells/mL) で、HE400AZ 培地を加えた 125 mL ディスポーザブル三角フラスコ (Erlenmeyer Flasks) に播種します。その際の最終の培地量は 30 mL として、三角フラスコは、ガス交換ができる状態にして、37°C、湿度の保たれた CO₂ インキュベーター庫内でシェーカー培養します。

培養 4 日目 (3 - 5 日間) に、50-mL 用の遠心チューブに、293 細胞を移します。遠心回収した細胞ペレットに、HE400AZ 培地を 10 mL 加えて懸濁します。細胞数と生存率を測定します。細胞密度 3×10^5 cells/mL ($2 - 4 \times 10^5$ cells/mL) で、HE400AZ 培地を加えた 125 mL ディスポーザブル三角フラスコ (培地量 30 mL) に播種して、シェーカー培養します。

継代培養の間隔は、グルタミンを選択した場合とアラニルグルタミンを選択した場合では異なります。コンフルエントの状況を観察して、継代培養の間隔を決定します。

< 静置培養 (T75 Flasks) >

細胞密度 3×10^5 cells/mL ($2 - 4 \times 10^5$ cells/mL) で、HE400AZ 培地を加えた T75 Flask (または 100 mL-dish) に播種します。その際の最終の培地量は 25 mL (100 mL-dish ; 20 mL) として、ガス交換ができる状態にして、37°C、湿度の保たれた CO₂ インキュベーター庫内で静置培養します。

培養 4 日目 (3 - 5 日間) に、50-mL 用の遠心チューブに、ピペッティングによって 293 細胞を移します。トリプシンを用いて細胞を回収する場合は、トリプシンインヒビターを使用して酵素反応を止めてください。遠心回収した細胞ペレットに、HE400AZ 培地を 10 mL 加えて懸濁します。細胞数と生存率を測定します。細胞密度 3×10^5 cells/mL ($2 - 4 \times 10^5$ cells/mL) で、HE400AZ 培地を加えた T75 Flask (培地量 25 mL) に播種して、静置培養します。

継代培養の間隔は、グルタミンを選択した場合とアラニルグルタミンを選択した場合では異なります。コンフルエントの状況を観察して、継代培養の間隔を決定します。

5 アダプテーション (HE400AZ 培地)

他の無血清培地に依存した 293 細胞は、上記の継代培養を繰り返すことによって、HE400AZ 培地に、アダプテーションできます。お客様のニーズに応じて、アダプテーションの受託サービスをお受けします。お気軽にお問い合わせください。

血清培地に依存した 293 細胞は、ダイレクトまたはシークエンシャルなアダプテーション培養によって、HE400AZ 培地に馴化できます。まず、現在のご使用の培養形態（例えば、静置培養）の条件で、アダプテーション培養を継続的に行ってください。

* 継代培養の時のトリプシン使用は、お避けください。お客様のニーズに応じて、製品アフターサービスをお受けします。お気軽にお問い合わせください。

6 凍結保存

293 細胞（生存率 95%以上、mid-log 増殖期の状態）を、遠心回収（200 x g、5 min）して、5–10 x 10⁶ cells/mL の細胞密度で、保存培地（HE400AZ 培地 with 10% DMSO）に懸濁します。一般的な細胞の凍結方法で液体窒素に保存します。

7 その他の情報

本製品は研究用です。ヒト及び動物の診断・治療、それ以外の特殊な条件下では、使用しないで下さい。本製品及び本製品を含む溶液に、酸または漂白剤を加えないで下さい。酸または漂白剤を混合すると有毒ガスを発生します。安全対策のもと、取り扱いには十分に注意してご使用下さい。安全データシート（SDS）及び品質保証データ（COA）はホームページ（<https://gmep.co.jp>）から取得して下さい。

8 関連製品

< Transfection System >

Gxpress 293 Transfection & Medium Kit	GX293-MAK-0010
Gxpress 293 Transfection & Medium Kit II	GX293-MK-0010
Gxpress 293 Transfection Kit	GX293-RK-0010
Gxpress 293 TF Reagent	GX293-TF-0010
Gxpress 293 Enhancer	GX293-EN-0010

< Chemically Defined Medium >

HE100 medium	HE100-0010	Adhesive culture
HE150 medium	HE150-0005	Cloning assay
HE200 medium	HE200-0010	Suspension culture
HE300 medium	HE300-0010	Suspension culture
HE300AZ medium*	HE300AZ-0010	Suspension culture
HE400 medium	HE400-0010	Suspension culture
HE400AZ medium*	HE400AZ-0010	Suspension culture
Gxpress 293 Feed medium	GX293-FD-0010	Fed-Batch culture

* Ready-to-use medium with L-alanyl-L-glutamine